

**Letalidade de Leishmaniose Visceral, segundo UF de residência.  
Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas. 2000 a 2006\***

Região e UF	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Região Norte</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>5,4</b>	<b>6,9</b>	<b>7,4</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>
Rondônia	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Acre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amazonas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Roraima	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0
Pará	4,1	2,9	5,2	5,8	5,1	5,5	5,5
Amapá	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tocantins	1,6	1,3	5,9	8,0	13,0	5,7	5,0
<b>Região Nordeste</b>	<b>3,2</b>	<b>6,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,8</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>7,8</b>
Maranhão	2,4	3,3	6,5	6,6	5,7	6,5	8,5
Piauí	2,2	6,7	5,5	9,1	6,0	5,9	6,6
Ceará	0,8	5,6	5,9	8,5	7,4	5,1	7,7
Rio Grande do Norte	5,4	4,1	5,9	6,5	3,6	4,2	1,6
Paraíba	4,6	2,1	15,0	6,5	3,6	16,1	5,9
Pernambuco	3,5	8,8	10,5	11,4	10,6	11,0	12,8
Alagoas	6,7	5,1	5,2	8,2	5,3	5,3	4,5
Sergipe	4,2	19,5	16,7	15,8	3,1	11,9	8,5
Bahia	3,1	12,5	9,1	7,9	6,8	8,0	8,2
<b>Região Sudeste</b>	<b>2,9</b>	<b>9,2</b>	<b>9,4</b>	<b>11,0</b>	<b>12,8</b>	<b>10,5</b>	<b>8,0</b>
Minas Gerais	2,8	13,1	7,0	9,2	12,4	9,9	9,2
Espírito Santo	0,0	0,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Rio de Janeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	11,1
São Paulo	3,4	3,6	14,4	15,1	13,5	12,1	5,9
<b>Região Sul</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>66,7</b>	<b>33,3</b>
Paraná	0,0	0,0	50,0	0,0	33,3	66,7	33,3
Santa Catarina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rio Grande do Sul	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Região Centro-Oeste</b>	<b>6,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10,0</b>	<b>12,1</b>	<b>9,7</b>	<b>12,6</b>	<b>12,3</b>
Mato Grosso do Sul	6,1	14,9	9,1	12,1	8,2	10,8	11,1
Mato Grosso	4,3	5,6	37,5	7,7	15,0	22,7	14,3
Goiás	4,5	11,1	5,9	14,3	10,7	23,1	15,6
Distrito Federal	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	20,0
<b>Brasil</b>	<b>3,2</b>	<b>6,6</b>	<b>7,6</b>	<b>8,5</b>	<b>8,2</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>

Fonte: Sinan/SVS/MS - atualizado em 18/09/07